Membrane de taille normale
Zone de passage de l'air normale

Dans des poumons sains, une faible couche de mucus tapisse les bronches

Avec la mucoviscidose, le mucus est épais : la zone de passage de l'air est diminuée

Physiopathologie de la mucoviscidose

Dr Nathalie Stremler-Le Bel

Pneumopédiatre CRCM pédiatrique CHU Timone Marseille

3^{ème} journée marseillaise de la Société de kinésithérapie et de Réanimation

2 décembre 2017

Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille

« Malheur à l'enfant chez qui un baiser sur le front a un gout salé; il est ensorcelé et va bientôt mourir. »

Mucoviscidose

=Mucus visqueux

Atteinte de la qualité des sécrétions muqueuses
de tout l'organisme

- Maladie décrite depuis plusieurs siècles
(...la préhistoire)
- Travaux de Dorothy et Fanconi dans les années 30-40 (autopsies de nourrissons, atteintes digestives + respiratoires, descriptions anapath)

= Maladie fibrosante congénitale kystique du pancréas

Ou

= Cystic fibrosis (of the pancreas)

QUELQUES INFOS

- origine génétique: autosomique récessive
- La plus fréquente en France
- 6000 personnes atteintes
- 1/4500 naissances ,350 nouveaux cas par an
- Sex-ratio= 1
- Age moyen de décès : 25 ans
- Espérance de vie > 45 ans
- Dépistage néonatal en 2002
- Création CRCM 2002
- 2014: apparition premier traitement curatif....

Répartition géographique sur le territoire français des personnes atteintes de mucoviscidose. Extrait du registre français de la mucoviscidose de 2007

Augmentation régulière de l'espérance de vie

PHYSIOPATHOLOGIE : DU GÈNE À LA PROTÉINE

- **Mutation du gène codant pour la protéine CFTR**

Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator

1 : Gène CF sur le bras long du chromosome 7 ;

2 : Protéine CFTR synthétisée après transcription de l'ADN en ARNm et traduction ;

3 : Expression de la protéine CFTR au pôle apical des cellules épithéliales après maturation intracellulaire

Gène codant pour CFTR

- Identifié en 1989 (Equipe Riordan et Collins).
- Situé sur le bras long du chr 7 (7q31.2)
- 250 Kb, 27 exons
- Code pour une protéine de 1480 aa

- Polymorphisme génétique :

Plus de 2000 mutations connues

D'après E. Girodon, Hopital H Mondor, Créteil

Fonction principale de la protéine CFTR :

CFTR :

CANAL CHLORE

R = domaine régulateur (ATP)
NDB = fixation aux nucléotides
TM = transmembranaire
Cl⁻ = ion chlorure

Réduction isotonique du liquide de surface des voies aériennes

Défaut sécrétion chlore
Hyperabsorption sodium

Hyperabsorption de sel
et d'eau

- Déshydratation du liquide de surface
- Altération de la clairance muco-ciliaire

Classification des mutations

Classes de I à VI

selon l'anomalie d'expression de la protéine CFTR

Classes de mutations du gène *CFTR*

NORMAL

Classes

I

II

III

IV

V - VI

**CFTR
non formée**

**CFTR
non mature**

**Régulation
altérée**

**Conductance
altérée**

**CFTR
formée
en faible
quantité**

**G542X
2.4%**

**ΔF508
68%**

**G551D
1.6%**

**R117H
<1%**

**5,7,9T
<1%**

EPITHELIUM NORMAL

EPITHELIUM DANS LA MUCIVISCIDOSE

BRANCHE NORMALE

BRANCHE DANS LA MUCIVISCIDOSE

Atteinte respiratoire

- Cils englués
- Altération clairance mucociliaire
- Infections bronchopulmonaires répétées
 - » Staphylocoque doré
 - » Haemophilus Influenzae
 - » Pseudomonas aeruginosa...
- Réaction inflammatoire intense
- Destruction bronchique
- Bronchectasies
- Insuffisance respiratoire
- Décès

Atteinte pancréas exocrine

- PHYSIOPATH

- Atteinte glandulaire
- Fréquente 85%
- Malabsorption
 - Graisses
 - Protéines

- SYMPTOMES

- Diarrhée grasseuse et chronique
- Hypotrophie
- Appétit vorace

Atteintes digestives

- **Atteinte pancréatique :**

- Insuffisance exocrine 85%

- Diarrhées graisseuses nauséabondes = stéatorrhée, mal digestion, malabsorption des graisses et vitamines liposolubles, dénutrition

- Insuffisance endocrine (Adulte jeune, insulinodépendant)

- Pancréatite chronique

- **Troubles de la motricité digestive : anomalie du lubrifiant digestif**

- Douleurs abdominales, constipation

- Sd d'occlusion intestinale distale aigue,

- Iléus méconial en période néonatale

- **Atteintes hépatiques :**

- Choletase

- Cirrhose biliaire

- Hypertension portale, varices œsophagiennes

Autres manifestations cliniques

- **Atteintes des glandes sudoripares** (sueur salée, risque de déshydratation surtout en été, perte eau/sel)
- Retard staturo-pondéral
- Dénutrition
- Anorexie
- Sinusite chronique, polype nasal
- Arthralgies, Ostéoporose
- Pb de stérilité masculine.....

2

Son rôle, qui consiste à servir de canal dans le transport d'ions chlore et sodium, est altéré

Protéine CFTR altérée

Cette protéine devient anormale

Gène

1

Mutations génétiques d'un gène qui fabrique la protéine membranaire CFTR

3

Le déséquilibre entre les ions entraîne la déshydratation et l'épaississement du mucus, avec accumulation de micro-organismes et libération de toxines

ions

4

Les conséquences sur... la peau:

Sueur riche en sel

les poumons:

Obstruction des bronches, infection, insuffisance respiratoire

le foie:

Destruction des voies biliaires, perturbation de la digestion

le pancréas:

Obstruction des canaux pancréatiques, blocage des enzymes digestives

l'intestin:

Obstruction par un épais bouchon

les organes génitaux:

Absence de canaux déférents, infertilité

UNE MALADIE DES MUCUS VISQUEUX

Classes de mutations du gène *CFTR*

NORMAL

Classes

I

II

III

IV

V - VI

CFTR non formée

G542X
2.4%

CFTR non mature

ΔF508
68%

Régulation altérée

G551D
1.6%

Conductance altérée

R117H
<1%

CFTR formée en faible quantité

5,7,9T
<1%