Dépense énergétique

Et

Techniques de mobilisation en U.S.I.

Frédéric Duprez PT, RT, PhD

Service des Soins Intensifs, Epicura Hornu

Enseignant master kiné Condorcet Tournai, Belgique

Conflit d'intérêt:

AUCUN

VO_2 et dépense énergétique

VO₂ et dépense énergétique

Débit cardiaque

$$VO_2 = FC * Vejs * DAVO_2$$

$VO_2 = \pm 250$ ml/min adulte (sain) 70 Kg au repos
(soit $\pm 3,5$ ml/min/Kg)

$VO_2 \propto$ à la puissance de l'exercice

Le métabolisme de base

Le **métabolisme de base** (MB) correspond aux besoins énergétiques "incompressibles" de l'organisme (activité cardiaque, cérébrale, respiratoire, digestive, maintien de la température du corps).

Composants de la dépense énergétique

Par 24H

Métabolisme basal (par 24 h)

Hommes: $\pm$ **1500 Kcal** (20 ans, 180 cm, 70 Kg)

Femmes: $\pm$ **1300 Kcal** (20 ans, 165 cm, 60 Kg)

DER = $\pm$ 1 Kcal/min (adulte sain au repos)

Besoins caloriques(par 24 heures)

♀ - ♂ sédentaires ± 2000Kcal =

♀ - ♂ actifs ± 2500 Kcal

♀ - ♂ sportifs ± 3000 Kcal

+/- 2000Kcal

Activité physique

- ➔ 1 marathon = $\pm$ 3000 Kcal
- ➔ 10 km en jogging = $\pm$ 750 Kcal

Dépend de la vitesse, du poids du sujet, du niveau d'entraînement

Si votre patient se mobilise activement, sa VO_2 augmente,
donc sa dépense énergétique aussi !

$$VO_2 = FC * Vejs * DAVO_2$$

Comment estimer la dépense énergétique des patients lors d'exercices physique ?

Estimation du **coût énergétique**

► Méthode directe

Estimation du **coût énergétique**

➔ Méthode indirecte

Eau doublement marquée:

Elle consiste à faire ingérer au sujet un mélange d'eau marquée sur l'oxygène (^{18}O) et sur l'hydrogène (deutérium). L'oxygène est plus rapidement éliminé que le deutérium et cette différence de vitesse d'élimination dépend de la production de CO_2 . La mesure de la différence d'élimination du deutérium et de l'oxygène 18 dans les urines permet le calcul de la production de CO_2 et de la dépense énergétique.

Estimation du **coût énergétique**

- ➔ **Méthode indirecte (Gaz expirés VO_2)**
(cfr Méthode de Haldane)

Bot SD et al. The relationship between heart rate and VO_2 during non-steady state exercise. *Ergonomics*. 2000 Oct;43(10):1578-92

Estimation du **coût énergétique**

$$VO_2 = FC * Vejs * \Delta AVO_2$$

➔ Méthode indirecte (FC)

$$VO_2 = FC * Vejs * \Delta AVO_2$$

FC

120

100

80

**Variabilité FC au cours de l'exercice =
estimation raisonnable du coût énergétique
de cet exercice pour un patient !**

Temps

FC

**Variabilité FC au cours de l'exercice =
estimation raisonnable du coût énergétique
de cet exercice pour un patient !**

Interprétation prudente si

- **Stress, pathologies cardiaques**
- **Bêta bloquants**
- **Variabilité de la pré-charge**
- **Pyrexie, douleur, CRP +++**

Temps

Estimation du **coût énergétique (C.E.)**

$$VO_2 = FC * Vejs * \Delta AVO_2$$

L'estimation du C.E. est estimée par la **différence** entre FC repos et FC effort

Comment peut-on apprécier la

valeur de la

dépense énergétique journalière de nos patients ?

En pratique

24

Puissance moyenne de l'exercice (watts)

Puissance
moyenne de
l'exercice
(watts)

*Energie (Joules) = Puissance * temps*

Efficacité revalid muscul : $E = \text{nbre jours} * \sum_i S_i$

$S_i = \text{Puissance moyenne}_i * \Delta t$

Puissance
moyenne de
l'exercice
(watts)

Temps

La dépense énergétique
= Intensité du travail musculaire x temps de l'exercice x **Nbre de répétitions**

$$E = \text{nbre jours} * \sum_i S_i$$
$$S_i = \text{Puissance moyenne}_i * \Delta t$$

Coût énergétique

- Coût énergétique **faible** = augmentation FC < à 10 %
- Coût énergétique (+) **élevé** = augmentation FC > à 10 %

De la FC de base !

Coût énergétique **faible**

Coût énergétique + **élevé**

Les exercices que nous appliquons en S.I. ne durent (en général) pas beaucoup de temps:
Car peu motivant, répétitifs, etc...

**Comment augmenter la
quantité de mouvement
chez nos patients ?**

Créer des exercices ludiques pouvant être réalisés plusieurs fois
par jour par le patient:

Exemples

- Ballon de baudruche
- Ballon anti éclatement

Ballon de baudruche

Exercices avec ballon anti éclatement

Mur de la chambre

Exercices avec ballon anti éclatement (Flipper géant)

« M.I.R.E. »

- 1) **M**otivation
- 2) **I**ntensité adaptée au patient
- 3) **R**épétitions
- 4) **E**ncouragements, empathie

1

$$Efficacit revalid muscul : E = \text{nbre jours} * \sum S_i$$

2

Rpter les exercices durant la journe (exercices ludiques)
Motiver le patient ++++

3

Cot nergtique est fct de la variation de la FC (entre repos et effort)

Merci pour
votre
attention